

KULLANMA TALİMATI

BEKSASOL 3 mg/5 mg kaplı tablet

Ağızdan alınır.

•**Etkin madde:** Her bir kaplı tablet en az 3 mg Sennosid B biçiminde standardize edilmiş hidroksi antrasen türevi içeren Senna meyvesi yaprağı ve ekstresi karışımı ve 5 mg Bisakodil içerir.

•**Yardımcı madde:** povidon-K 90, laktoz monohidrat (flowlac 100) (inek sütünden elde edilmiştir), sodyum sülfat anhidrat, mısır nişastası prejelatinize, koloidal silikon dioksit (aeroperl 300 pharma), magnezyum stearat, opadry 03K19229 (hipromelloz, triasetin, talk,), acryl EZE 93O18509 (metakrilik asit-etil akrilat kopolimer, talk, titanyum dioksit, trietil sitrat, koloidal silikon dioksit, sodyum bikarbonat, sodyum lauril sülfat,), acryl EZE 93A18597 (metakrilik asit-etil akrilat kopolimer, talk, titanyum dioksit, koloidal silikon dioksit, sodyum bikarbonat, sodyum lauril sülfat)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BEKSASOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BEKSASOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BEKSASOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BEKSASOL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BEKSASOL nedir ve ne için kullanılır?

BEKSASOL 30 kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulur.

BEKSASOL, bağırsak mukozasına direkt etki ile bağırsak hareketlerini ve içeriğinin geçiş hızını artırır, su ve elektrolit salgılanmasını engeller. Bu etkiler ile dışkıının yumuşatılması ve atılması sağlanır.

BEKSASOL kabızlığın kısa süreli tedavisinde kullanılır.

2. BEKSASOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEKSASOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin madde veya bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Bulantı, kusma veya apandisit düşündüren bulguların varlığında, sebebi bilinmeyen karın ağrısı, bağırsak tıkanıklığı, Krohn's hastalığı, ülseratif kolit gibi ateş, ishal, karın krampları ile seyreden bağırsak rahatsızlıkları, ameliyat sonrasında ve aşırı olarak elektrolit (su ve tuz kaybı) dengesinin bozulduğu durumlarda kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

BEKSASOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanımın bağırsak tembelliği ve su-elektrolit dengesi bozukluğu yapabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Bağırsak tıkanıklığı ya da tanısı henüz konmamış karın içi yakınmaları olan hastalara uygulanmamalı ve enflamatuvar bağırsak hastalıklarında dikkatle kullanılmalıdır.

Diabetes mellitus (şeker hastalığı), hipertansiyon (tansiyonda artış) ve kalp hastalığı bulunanlarda doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

1 haftadan daha uzun süreli konstipasyonda (kabızlıkta) doktora başvurulmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BEKSASOL'ü yiyecek ve içecek ile kullanılması

Herhangi bir yiyecek ya da içecek ile etkileşime girdiğine dair bir bilgi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda kullanımı önerilmemektedir. Diyet veya başka önlemlere rağmen kabızlık düzelmiyorsa, yalnızca hamileliğin ilk 3 ayında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

BEKSASOL'ü araç ve makine kullanımını etkilediğine dair hiçbir bilgi yoktur.

BEKSASOL'ü içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEKSASOL laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Potasyum eksilmesine bağlı olarak, kalp kasını güçlendiren ilaçların (kardiyak glikozitlerin) veya kalp ritmini düzenleyen ilaçların (antiaritmikler) etkisini arttırabilir.

Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar), kortikosteroidlerle birlikte kullanımı potasyum kaybını artırabilir.

Antiasidler ve simetidin ile birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçların uygulanmasından iki saat sonra alınabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BEKSASOL nasıl kullanılır?**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; yetişkinlerde gece yatmadan önce, ağızdan bir miktar su ile 1 kaplı tablet alınır.

1 haftadan daha uzun süreli konstipasyonda (kabızlıkta) doktora başvurulmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Gece yatmadan önce bir miktar su ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel bir kullanım şekli bulunmamaktadır. Doktorunuza danışarak kullanınız.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Özel bir kullanım şekli bulunmamaktadır. Doktorunuza danışarak kullanınız.

Eğer BEKSASOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKSASOL kullandıysanız

Yüksek dozda kullanılması sonucunda; birdenbire nöbet tarzında gelen karın ağrısı (kolik) ve kramp gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, şişkinlik, hipotansiyon, baş dönmesi ve ishal görülebilir.

BEKSASOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEKSASOL'ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEKSASOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BEKSASOL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BEKSASOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BEKSASOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, deri döküntüsü)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEKSASOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek:

- Baş dönmesi
- Tansiyonda düşme
- Bağırsaklarda gaz şikâyeti
- İskemik kolit dahil kolit

Çok seyrek:

- Karın ağrısı
- İshal
- İdrar renginin koyulaşması veya kızarması

Bunlar BEKSASOL'ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BEKSASOL'ün saklanması

BEKSASOL'ün çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEKSASOL'ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEKSASOL'ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Argis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Yenimahalle/ANKARA

Üretim yeri:

Argis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Yenimahalle/ANKARA

Bu kullanma talimatı 15/05/2026 tarihinde onaylanmıştır.