

KULLANMA TALİMATI

KWASKAB %5 krem

Haricen kullanılır.

Etkin maddeler: Her 1 g'ında; 50 mg permetrin içerir.

Yardımcı maddeler: Metil paraben, Propil paraben, Butil hidroksitoluen, Setil alkol, Makragol setostearil eter, Parafin likit, Propilen glikol, Sitrik asit anhidrat, Sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **KWASKAB nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KWASKAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KWASKAB nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KWASKAB'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. KWASKAB nedir ve ne için kullanılır?

KWASKAB, bit ve benzerlerine karşı etki gösterir ve bu hayvanları, sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

KWASKAB, 30 g'lık ve 60 g'lık HDPE burgulu kapaklı alüminyum tüpler içerisinde sunulmuştur.

KWASKAB, yetişkinlerde ve 2 aydan büyük çocuklarda uyuz tedavisi ve pubis biti (kasık biti) enfestasyonlarında/bulaşmalarında kullanılır.

2. KWASKAB'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KWASKAB'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Etkin madde permetrin veya piretrinler ya da sentetik türevleri olan piretroidler grubuna ait diğer maddelere veya ürünün herhangi bir içeriğine alerjisi olan kişilerde KWASKAB kontrendikedir.



KWASKAB'ı ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- KWASKAB'ın gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas ederse gözünüzü bol suyla yıkayınız.
- Eğer KWASKAB'ı yüzünüze sürecekseniz, göz çevresine yakın uygulamalarda dikkat ediniz.
- Eğer çocuğunuza uygulayacaksanız, ağız çevresine sürmemeye dikkat ediniz; çocuğunuz ilacı yalayabilir.
- Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriř olmaması için eldiven kullanınız.

KWASKAB'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve iecek tüketiminden etkilenmesi olası değıldir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

KWASKAB'ın fare, sıan ve tavřanlarda yapılan üreme alıřmaları fertilite üzerinde olumsuz bir etki veya fetüs üzerinde zararlı bir etki göstermemiřtir. Ancak, gebelerde yeterli ve iyi kontrollü alıřmalar bulunmamaktadır. Hayvan üreme alıřmaları her zaman insanlardaki yanıtları öngöremeyeceğinden, bu ilaç gebelik sırasında yalnızca kesinlikle gerekli görüldüğünde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

KWASKAB'ın insanlarda anne sütü iinde atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Birok ilacın insan sütüne getiğı göz göz önünde bulundurularak, emzirme süresince ilacın kullanımından kaçınılması ya da ilacın kullanımı gerekiyorsa emzirmeye geici olarak ara verilmesi dikkate alınmalıdır.

Ara ve makine kullanımı

KWASKAB'ın ara ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası değıldir.

KWASKAB'ın ieriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İeriğindeki bütıl hidroksitoluen ve setil alkol nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahriře sebebiyet verebilir. Paraben ierdiği iin alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) neden olabilir. Propilen glikol, tahriře neden olabilir, doktorunuza veya eczacınıza danıřmadan açık yaralara ve geniş hasarı olan cilt üzerine (yanık vb.) uygulanmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

KWASKAB'ın bilinen herhangi bir ilaç ile etkileřimi yoktur.



Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KWASKAB nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Uyuz tedavisi

Cilt tipi ve yüzey alanında bireysel değişikliklerin farklılığı göz önünde bulundurulduğunda doz konusunda kesin tavsiyeler yapılması mümkün değildir.

Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar

Tek uygulamada yaklaşık bir tüpe kadar kullanılabilir. Bazı erişkinlerde tüm vücudu kaplamak için 30 g'lık bir tüpten fazlası gerekebilirse de iki tüpten (60g) fazlası uygulanmamalıdır.

Pubis biti (Kasık biti) tedavisi

30 g'lık bir tüpün 1/3'ü, pubik bölge (kasık bölgesi), anüs çevresi, uyluk bölgesi ve gövdeye uygulanması tavsiye edilir. Az bir erişkin grubu tedaviyi tamamlamak için daha fazla kreme ihtiyaç duyabilir, fakat 30 gramlık tüpün 2/3'ünden fazlası kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Uyuz Tedavisi

1. Duş alındıktan sonra temiz, kuru ve serin vücuda baş dışında tüm vücut kaplanacak şekilde uygulanır.
2. Uygulamada özellikle el ve ayak parmakları arasında kalan alanlar, bilekler, koltuk altları, dış genital organlar, kaba etler, el ve ayak tırnaklarının altına dikkat edilmelidir.
3. 8-14 saat beklenir. Bekleme süresinde eller yıkanmışsa, ellere tekrar sürülmesine özen gösterilir.
4. Uygulama sonrasında duş alınır.
5. Temiz giysiler giyilir, yatak çarşafı ve giysiler sıcak su ile yıkanıp, sıcak ütü ile ütülür.

Uyuzdan Korunmanın Yolları

1. Tüm aile kontrol edilmeli, bulaşması olası aile dışı arkadaş veya akrabalar uyarılmalıdır.
2. Tüm aile bireylerine uyuz tedavisi uygulanmalıdır.
3. Uyuz böceği eşyalar üzerinde 2-3 gün yaşayabildiği için, tüm eşyalar ve giysiler kaynar su ile 20 dakika süre ile yıkanmalı, tüm giysilerin (giyecekler, çarşaf, yastık kılıfları vs.) özellikle vücutla temas eden iç bölgeleri sıcak ütü ile ütülenmelidir.
4. Tüm ev ve araba elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.

2 aylıktan 2 yaşa kadar çocuklarda ve yaşlılarda

2 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinlerdeki uygulamaya benzerdir. Buna rağmen, bu hasta gruplarında, uyuz lezyonları yüz, boyun, saçlı deride ve kulaklara daha çok sıçramış olduğundan, KWASKAB'ın bu bölgelere de sürülmesi etkilidir. Hastaların yaklaşık %90'ında



uyuz enfestasyonu kremin tek bir uygulamasıyla giderilir. Eğer varolan lezyonlarda iyileşme belirtisi yoksa veya yeni lezyonlar oluşursa, ikinci bir uygulama 7 günden önce olmamak üzere yapılabilir. İki aydan küçük bebeklerde güvenlik ve etkinlik belirlenmemiştir.

Pubis biti tedavisi

KWASKAB, pubik bölgeyi (kasık bölgesi), anüs çevresini, uyluk bölgesinin iç tarafından dizlere kadar ve pubik (kasık bölgesi), bölgeye uzanan gövdedeki tüyleri kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Kirpikler ve kaşlar hariç yüz tüylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır. Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, KWASKAB iritasyona neden olabileceği için gözlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadan kaldırılabilir. Buna rağmen, uygulamadan 7 gün sonra uygulanan bölgede canlı bit görülürse, ikinci bir tedavi uygulanabilir.

Değişik yaş grupları:

• Çocuklarda kullanım:

Uyuz tedavisi

12 yaşın altındaki çocuklar: 30 gramlık bir tüp esas alınarak tek uygulamada kullanılacak yaklaşık krem miktarı aşağıda belirtilmektedir:

2 aylıktan 1 yaşa kadar çocuklar	; bir tüpün 1/8'i kadar
1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar	; bir tüpün 1/4'ü kadar
6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar	; bir tüpün 1/2'si kadar

Baş boyun saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda, tüm vücudun kaplanması için doz artırılabilir.

Pubis biti (Kasık biti) tedavisi

Çocuklar ve nisbeten az tüylü kişilerde oransal olarak daha az krem kullanılmalıdır.

• Yaşlılarda kullanımı:

70 yaş üzerindeki hastalar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

• Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Bu ilacın esas olarak böbrekler yoluyla atıldığı bilinmektedir. Ancak, permetrin cilde uygulandığında karaciğerde etkisiz hale getirilerek idrarla atıldığından, böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda önerilen dozda kullanıldığında ciddi yan etki riskinin arttığı düşünülmemektedir.

Eğer KWASKAB'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KWASKAB kullandıysanız:

KWASKAB'ın aşırı uygulanması bölgesel yan etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları



ihhtimali taşıır. Aşıırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğünde belirtilere yönelik tedavi yapılır. Kazara bir çocuk KWASKAB içeriğini yutarsa, yutulmayı takiben 2 saat içinde hekime başvurulur durumlarda midenin yıkanması uygundur.

KWASKAB'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KWASKAB'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KWASKAB ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuzun size söylediğı süre zarfında kullanın.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, KWASKAB'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğı şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

- Uyuşma, karıncalanma hissi
- Deride yanma hissi
- Kaşıntı
- Deride kızarıklık ve kabarıklık
- Kuru cilt

Seyrek:

- Baş ağrısı

Çok seyrek:

- Nefes darlığı (duyarlı/alerjik hastalarda)
- Ekskoriasyon (ciltte kaşıma veya travmaya bağı yüzeyel yara oluşumu)
- Folikülit (kıl kökü iltihabı)
- Cilt hipopigmentasyonu (ciltte açık renkli beyaz lekeler oluşması)



Bilinmiyor:

- Bulantı
- Kontakt dermatit (cildin bir maddeyle temasından sonra kızarma, kaşıntı ve tahriş oluşması)
- Ürtiker (ciltte ani ortaya çıkan, kaşıntılı, kırmızı kabarcıklar, kurdeşen)

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. KWASKAB’ın saklanması

KWASKAB’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KWASKAB’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Argis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Batı Sitesi Mah. Gersan Sanayi Sitesi
2307. Cadde No:80-82-86
Yenimahalle/ANKARA

Üretim Yeri:

Argis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Batı Sitesi Mah. Gersan Sanayi Sitesi
2307. Cadde No:80-82-86
Yenimahalle/ANKARA

Bu kullanma talimatı 13/11/2025 tarihinde onaylanmıştır.

